

Vogelarten am Nußberg



Idee und Zusammenstellung: Wolfgang E. Schulz

Stand: August 2011

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Amsel	stark reduziert durch eine Krankheit 2005 - 2006	Einzelpaare wieder vorhanden. Der Hagelschlag am 23. Juli 2009 dürfte der Population stark zugesetzt haben	
Baumpieper	kaum mehr zu sehen	Flatternder Aufstieg auf einem Baum. Bei Erreichung des Baumwipfels verhält er kurz. Danach lässt er sich im Sinkflug zu Boden fallen und singt seine Melodie	
Birkenzeisig	kaum mehr zu sehen, oder zu hören	Hier handelt es sich um einen Irrgast, der bei uns nicht heimisch ist	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Blässhuhn	Häufiger auf der Wasserseite in der Kuchelau	Winterzeit	
Blaumeise Kohlmeise Tannenmeise	gut vertreten Tannenmeise in einer Fichte am Beethovengang (Höhlenbrüter)	wir haben zwei Kästchen hängen. Mitte März Nestbau, April Eier. Ende April Junge im Nest, 5-7 Stück – zweite Brut schon immer	
Buchfink	vorhanden	in Nußdorf im Kastanienbaum	
Dorngrasmücke	kommt auch noch vor	sehr selten	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Eichelhäher	vorhanden	In Nußdorf schon gesehen	
Elster	stark vertreten	in den Weingärten und Randsträuchern am Burgstall stark vertreten	
Feldlerche	beim Durchzug zu sehen	Bodenbrüter, kaum mehr zu hören	
Gänsesäger	vorhanden	in der Kuchelau und am Strom zur Winterzeit	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Gartenrotschwanz	verschwunden		
Gelbspötter	ganz selten	war früher in der Kuchelau, jetzt Donauinsel	
Gimpel (Dompfaff)	selten anzutreffen	In der Winterzeit hie und da zu sehen	
Girlitz	kommt noch vor	ist schwer von Ammer und Zeisig im Gesang zu unterscheiden	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Goldammer	nicht mehr da	vor Jahren Vogel des Jahres	
Grünling	vorhanden	gesellt sich gerne unter die Sperlinge	
Haenfling	kommt kaum mehr vor	weil alles im Weingarten mechanisch gemacht wird. Ebenso sind die Krähen und Elstern die Feinde	
Hausrotschwanz	noch da	oft in kleinen Nischen bei Häusern zu sehen. Vormalig Buschbewohner	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Heckenbraunelle	vorhanden	lebt in Sträuchern. Eine hat sich erst kürzlich an einem Windfangfenster „dastess'n“	
Kleiber	vorhanden (Höhlenbrüter)	der einzige Vogel, der senkrecht den Baum hinuntergehen kann. Hält sich nur bei besten biologischen Bedingungen. Klebt sein Flugloch mit Speichel wie Beton, auf seine Körperstärke abgestimmt, zu.	
Kormoran	kommt vor	im Donaubereich zur Winterzeit häufiger zu sehen	
Kuchelau: Tafelente, Moorente, Schellente, Reiherente	zur Winterzeit	in der Kuchelau und Donaubereich	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
			
Kuckuck	kaum noch zu hören		
Laubsänger Fitis	kommt noch vor, aber sehr selten		
Mehl-; Rauchschwalbe	vorhanden	werden immer weniger. 2009 beim Steinschaden kein Pärchen im Nest. Heuer 2010 wieder nistet wieder ein Pärchen Rauchschwalbe	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Wacholderdrossel	nicht stark vertreten	<p>schwer feststellbar. Schwärme zur Winterzeit. Am 15.2.2011 wurde eine im Garten Erocigasse 43 um 14 Uhr gesichtet (Schulz)</p> <p>Misteldrossel: gering – einzeln, schwer zu erkennen, da der Wacholderdrossel sehr ähnlich</p>	
Mönchsgrasmücke	noch vorhanden	<p>im Volksmund Schwarzblattl (wegen der schwarzen Haube) genannt. Kommt im Gesang ungefähr nach der Nachtigall. Der Ausdruck „Blattl“ kommt von den Vogelfängern, weil sein Gesang einem z.B. Flötenblattl ähnlich kommt. Mehrfach im Bereich Wildgrube am Schreiberbach gesehen und gehört</p>	
Mönchgrasmückenhenne	mit braunem Häubchen	<p>am 17.6.2010 haben Hr. Hengl und ich einen tot in meinem Vorgarten - Erocigasse 43 gefunden.</p>	
Nachtigall	vor vier Jahren das letzte Mal schlagen gehört	<p>bei den ehemaligen Greinergründen. War hier eine Ausnahme.</p>	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Nebelkrähe	Überpopulation	Jagdverbot nicht aufgehoben. Vergesslichkeit unserer Politiker. Nesträuber. Füttert seine Brut auch mit nackten Jungvögel aller Kleinvögel. Trägt aber dadurch nicht zum Rückgang des Singvogelbestandes bei. Dieser wird hauptsächlich durch die Intensivierung der Landwirtschaft, und die zunehmende Verbauung bewerkstelligt.	
Neuntöter	vorhanden	spießt sich seine Beute auf Dornen. Heuschrecken, auch kleine Mäuschen. Im Volksmund auch Dorndreher genannt. Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) – Der Neuntöter ist eine Charakterart strukturierter Weinbaugebiete. Für die Größe des Weinbaugebiets von Döbling ist das derzeitige Vorkommen in diesem Bezirk verhältnismäßig klein. Der Grund dafür dürfte in der intensiven Bewirtschaftung der Weingärten liegen (Donnerbaum & Wichmann, 2003).	
Pirol	vorhanden	in der Klosterneuburger Au. Schwer zu sehen, besser zu hören	
Reiherente	vorhanden	in der Kuchelau (Winter). Weibchen unscheinbar bräunlich	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Schwan	selbstverständlich	wird nicht bejagt. Vermehrung auch durch Eutrophierung der Gewässer	
Schwanzmeise	in Schwärmen	nur im Durchzug, insbesondere zur Winterzeit	
Schwarz- und Braunkehlchen	fast nicht mehr da	eine Rarität	
	am Nußberg direkt nicht vorhanden	In Auwäldern bei Gewässer rändern – eben Schilf. Der Schlagschwirl läßt sich schwirrend von hohen Bäumen im Bogen herabgleiten	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Seidenschwanz	zu hunderten vorhanden, wenn es im Norden kalt ist. Sonst nicht vorhanden	liebt den Feuerdorn. Innerhalb von einem Tag ist ein Strauch abgeräumt. Manche Jahre in Schwärmen. Verschmutzen durch ihren Kot den ganzen Gehsteig	
Singdrossel	am Nußberg nicht mehr vorhanden	Schuld daran ist die Nebelkrähe, welche die Nester ausraubt. Das 4. Jahr kein Gesang.	
Spechte: Weisrückenspecht, Dreizehenspecht, Blutspecht Grünspecht, Grauspecht	vorhanden	Kleinspechte, klein und groß Buntspechte – (seltener). Im Garten des Hauses Erocagasse 43 ist dieser öfters im Garten zu Gast.	
Sperber	vorhanden	greift seine Beute meistens im Fluge in Bodennähe. Gleitet lautlos durch lockeres Gebüsch. Wurde im Juni 2010 im Vorgarten Dennweg 1 beobachtet. Hält sich dort auf, wo sich Kleinvögel reichlich aufhalten (Brutnester)	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Stare	früher weg, jetzt wieder da	überwintern teilweise. Starke Schwärme nach der Brutzeit, in der warmen Jahreszeit und zur Weintraubenreife	
Steinkautz	am Nußberg und in Wien nicht mehr vorhanden	Waldkauz ganz selten zu hören	
Steinschmätzer	im Frühjahr noch da	nur im Durchzug	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Türkentaube	eingewandert	ab 1941 aus Kleinasien zugewandert	
Turmfalke (Rüttelfalke)	am ganzen Nußberg	das Männchen hat ein gräuliches Häubchen	
Wacholderdrossel	sehr stark vertreten	besonders zur Winterzeit	
Weidenmeise	selten	Einzelpaare	
Wendehals	verschwunden	früher Bockkellerstraße in den Kastanien.	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
Wiedehopf	Vorhanden (Höhlenbrüter)	verwendet Kuh und Pferdemist. Der Marder scheut diesen Geruch, daher kein Nestraub. Schon länger keinen mehr gesichtet. Im Burgenland wird er volkstümlich " Wuderer " genannt	
Zaunkönig	vorhanden	im Bereich Schreiberbach vor Endstation Nußdorf zuletzt gesichtet	
Zilpzalp	vorhanden	Baumsänger. Durch seinen Gesang ("zilpzalp") ergibt sich sein Name	
Zwergtaucher	vorhanden	Kuchelau Sommer- und Winterzeit, wenn gefroren, im Strombereich	

NAME	EXISTENT?	EIGENARTEN U. LEBENSSTIL	VOGELANSICHT
			

Dieser Beitrag wird laufend ergänzt und verbessert. Falls Ihnen zu diesen Ausführungen Ergänzungen oder Klarstellungen einfallen, wird um eine Mitteilung per E-Mail an schulz@wien-doebling.at gebeten.

Diese Zusammenstellung wurde unter der freundlichen Mitarbeit eines pensionierten Hobbyornithologen aus Nußdorf (Herr Böck) im Juli 2008 aufgezeichnet. Das Lay-out hat Herr Alfred Hengl mitgestaltet. Bilder: Aus dem Internet-Sammlung Schulz

Wien im August 2010



Wolfgang E. Schulz
 Heimatforscher aus Leidenschaft